

07 Infecties van keel, neus en oren

Indicatie	Therapie	dosering	therapieduur	Opmerkingen
Angina Plaut-Vincent	metronidazol	500 mg 3 dd po	7 dagen	
Dentogene infecties	amoxicilline-clavulaanzuur of clindamycine	625 mg 4 dd po 600 mg 3 dd po	7 dagen 7 dagen	
Furunkel in de neus				Bij voorkeur iv therapie
Epiglottitis, Laryngitis, Laryngitis subglottica				Direct verwijzen naar dichtstbijzijnde ziekenhuis
Mastoiditis				verwijzen KNO-arts
Acute vorm	a. aluminiumacetotartraat oordruppels 1,2% FNA b. aluminiumacetotartraat oordruppels 12% FNA			bij open trommelvlies. bij gesloten trommelvlies.
"Maligne" vorm (Pseudomonas) idem acute vorm, plus: Chronische vorm	ciprofloxacine	750 mg 2 dd po	4-6 weken	Behandeling primair richten op de veelal tegelijkertijd aanwezige otitis media.
Bij schimmel- of gistinfectie:	miconazol oordruppels (2%) Miconazol crème (20 mg/g) 2%	3 druppels 3 dd op tampon	max. 7 dagen 10 dagen	Natte vorm, intact trommelvlies Droge vorm
Otitis media acuta	decongestiva + analgetica gedurende 4 dagen. Bij onvoldoende resultaat: amoxicilline-clavulaanzuur of cotrimoxazol of clindamycine	625 mg 4 dd po 960 mg 2 dd po 600 mg 3 dd po	7-10 dagen 7-10 dagen 7-10 dagen	antibiotica op geleide van het kweekresultaat van vocht uit het middenoor.
Otitis media met efusie	geen			Consult kno-arts
Otitis media (chronisch)				Systemische AB alleen ogv gevoeligheidspatroon
Peritonsillair abces, Retrofaryngeaal abces				Direct verwijzen naar dichtstbijzijnde ziekenhuis
Sinusitis acuat	geen			Antibacteriële behandeling heeft in het algemeen geen effect
Sinusitis, subacute en chronisch	amoxicilline-clavulaanzuur of cotrimoxazol of clindamycine	625 mg 4 dd po 960 mg 2 dd po 600 mg 3 dd po	7-10 dagen 7-10 dagen 7-10 dagen	Op geleide van het gevoeligheidspatroon van het uit de spoelvoeistof of het punctaat geïsoleerde micro-organisme
Stomatitis : Gisten	nystatine suspensie	4 dd aanbrengen	14 dagen	Tot 2 dagen na verdwijnen laesies, maar minimaal 14 dagen
Herpes simplex virus	valaciclovir	1000 mg 3 dd po	7 dagen	
Tonsillitis of faryngitis	feneticilline of fenoxymethylpenicilline of amoxicilline claritromycine of azitromycine	500 mg 4 dd po 500 mg 4 dd po 375-750 mg 3dd po 500 mg 2 dd po 500 mg 1 dd po	10 dagen 10 dagen 10 dagen 10 dagen 3 dagen	Antibiotica alleen bij ernstige ziekteverschijnselen, indien een nephritogeen type circuleert, of bij roodvonk. Cave ziekte van Pfeiffer
Bij allergie betalactam				