



ADC

Analytisch Diagnostisch Centrum

Antibiotica formularium - Ziekenhuis - NL

www.adcnv.com

13 sepsis

Indicatie	Therapie	dosering	therapieduur	Opmerkingen
onbekende verwekker, onbekend focus na drie dagen ZH-opname	amoxicilline-clavulaanzuur + gentamicine piperacilline + tazobactam	4 dd 1200 mg iv 1 dd 5 mg/kg iv 4000+ 500 3 dd iv		Aanpassen op geleide van de bloedkweken maximaal 3 dagen
Onbekende verwekker, focus : pneumonie	amoxicilline-clavulaanzuur + ciprofloxacin	4 dd 1200 mg iv 2 dd 400 mg iv		
Onbekende verwekker, focus : meningitis	Ceftriaxon Indien > 60 jaar: Amoxicilline	2 dd 2000 mg iv 6 dd 2000 mg toevoegen		
Onbekende verwekker en: perforatie peritonitis of urinewegsinfectie	amoxicilline-clavulaanzuur + gentamicine	4 dd 1200 mg iv 1 dd 5 mg/kg iv.		maximaal 3 dagen
Bij verdenking Salmonella sepsis	amoxicilline-clavulaanzuur + ciprofloxacin	4 dd 1200 mg iv 2 dd 400 mg iv		