

Type operatie	Profylaxe	dosering	Opmerkingen
KNO Stapedectomie, Inbrengen cochlea-implantaat Implantaat/bot-transplantaat neus (S)	cefazoline	1 gram éénmalig i.v.	
THORAX-CHIRURGIE Lobectomie en Pneumectomie (SG) Penetrerend thoraxtrauma < 6 uur oud (SG)	cefazoline	1 gram éénmalig i.v.	
VAATCHIRURGIE Aorta reconstructie (S) Vaatchirurgie met Liesincisie (S)	cefazoline	1 gram éénmalig i.v.	alternatief 3 dd i.v. gedurende 24 uur
TRACTUS-LOCOMOTORIUS CHIRURGIE Implantatie van kunstgewrichten (S) Osteosynthese (S) Amputatie onderste ledematen op basis van ischaemie (S) Amputatie onderste ledematen met necrose van de voet (G) Gecompliceerde/open fracturen(G) Overige ingrepen (S)	cefazoline cefazoline cefazoline Op geleide van kweek Op geleide van kweek cefazoline	1 gram éénmalig i.v.* 1 gram éénmalig i.v. 1 gram éénmalig i.v. 1 gram éénmalig i.v.	* 20 min. vóór incisie of 10 min. vóór aanbrengen tourniquet. therapeutisch therapeutisch
TRACTUS UROGENITALIS Operaties aan de urinewegen bij steriele urine (S) Operaties aan de urinewegen bij niet-steriele urine (G) Vaginale/abdominale hysterectomie (SG) Secundaire sectio caesaria (SG) Manuele placentaverwijdering (SG) Abortus in het 2° trimester of in het 1° trimester na pelviene inflammatoire ziekte (PID) (SG) Vulvectomie (SG)	Geen Op geleide van kweek cefazoline Alternatief 2° gen cefalosporine cefazoline cefazoline cefazoline cefazoline cefazoline	 1 gram éénmalig i.v. éénmalig alleen bij hoog risico 1 gram éénmalig i.v. 1 gram éénmalig i.v. 1 gram éénmalig i.v. 1 gram éénmalig i.v.	 therapeutisch NL: gecombineerd met metronidazol voor de ingreep
TRACTUS -DIGESTIVUS Liesbreuk (S/SG) Gastroduodenale operaties (SG) bij: - hypochloorhydrie - gestoorde motiliteit - extreme obesitas Galweg operaties(SG) - acute cholecystitis - choledochussteen (>70 jaar) - obstructie icterus Penetrerend buiktrauma < 6 uur oud (SG) Colorectale operaties (SG) Appendectomie(SG) Appendectomie: geperforeerd of gangreneus (G)	cefazoline cefazoline cefazoline+ metronidazol Cefazoline Cefazoline cefazoline+ metronidazol cefazoline+ metronidazol (Alternatief : neomycine + erythromycine base oraal) erythromycine oraal cefazoline+ metronidazol amoxicilline + clavulaanzuur 2000/200mg	1 gram éénmalig i.v. 1 gram éénmalig i.v. 1 gram éénmalig i.v. + 500 mg 1 gram éénmalig i.v. 1 gram éénmalig i.v. 1 gram éénmalig i.v. + 500 mg 1 gram éénmalig i.v. + 500 mg 1 gram éénmalig i.v. + 500 mg	 Bij electieve chirurgie ook mechanische darmreiniging Gevolgd door therapie o.g.v. kweek

(S) = schoon

(SG) = schoon-gecontamineerd

(G) = gecontamineerd