



03 Endocarditis

Indicatie	Therapie	dosering	therapieduur	Opmerkingen
Empirische therapie bij natieve kleppen				
Subacute endocarditis en langdurig beloop	Amoxicilline + gentamicine	2000 mg 6 dd iv 3 mg/kg 3 dd iv		Meestal kan men wachten met het starten van de antibiotica tot de bloedkweekresultaten bekend zijn
Fulminant beloop en bij intraveneuze drugsgebruikers	Flucloxacilline + gentamicine	2000 mg 6 dd iv 3 mg/kg 3 dd iv		Altijd bloedkweken afnemen voor start antibiotica
bij penicilline overgevoeligheid	Vancomycine + gentamicine	1000 mg 2 dd iv 3 mg/kg 3 dd iv		
Empirische therapie bij klepprothese				
	Vancomycine + gentamicine	1000 mg 2 dd iv 3 mg/kg 3 dd iv		
Bij bekende verwekker				
Streptokokken				
Goed gevoelig voor penicilline (MIC < 0,1 mg/l):	benzylpenicilline + gentamicine	2 milj. E 6 dd iv 3 mg/kg 3 dd iv		Benzyl penicilline: ongecompliceerd: 2 weken. Gecompliceerd (extracardiaal focus of cardiaal abces): 4 weken. Klepprothese: 6 weken Gentamicine 2 weken
Matig gevoelig voor penicilline (MIC > 0,1 mg/l):	benzylpenicilline + gentamicine	2 milj. E 6 dd iv 3 mg/kg 3 dd iv		4 weken bij klepprothese: benzylpenicilline 6 weken en gentamicine 4 weken
Gentamicine high-level resistent:	benzylpenicilline	2 milj. E 6 dd iv		6 weken
<i>Enterococcus faecalis</i> en andere enterokokken	amoxicilline + gentamicine	2000 mg 6 dd iv 3 mg/kg 3 dd iv		6 weken 2 weken
<i>Staphylococcus aureus</i>	flucloxacilline + gentamicine	2000 mg 6 dd iv 3 mg/kg 3 dd iv		6 weken 2 weken
<i>Staphylococcus epidermidis</i>				
bij klepprothese				
Goed gevoelig voor flucloxacilline	Flucloxacilline + gentamicine	2000 mg 6 dd iv 3 mg/kg 3 dd iv		6 weken 4 weken
Ongevoelig voor flucloxacilline	vancomycine + rifampicine + gentamicine	1000 mg 2 dd iv 3 dd 300 mg po 3 mg/kg 3 dd iv		6 weken 6 weken 2 weken